



XII CAIC – Congresso Anual de Iniciação Científica
XV ECIF – Encontro Científico da FAMERP
VII COLIG – Mostra das Ligas Acadêmicas
Dias 06 e 07 de outubro de 2015



AVALIAÇÃO DE TENTATIVAS DE SUICÍDIO POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA

Elis Duarte Parravicini¹, Julio César Razera de Melo², Juliana Yogolare Gonçalves³, Maria Carolina dos Santos Marçal Ribeiro⁴, Carlos Alberto Caldeira Mendes⁵, Gerardo Maria de Araujo Filho⁶.

¹FAMERP, ²FAMERP, ³FAMERP, ⁴FAMERP, ⁵FUNFARME, ⁶FAMERP.

Introdução: O suicídio é considerado uma das maiores causas de morte não natural e deve ser tratado como um problema de saúde pública. As tentativas de suicídio resultam em atendimentos e internações hospitalares que geram gastos públicos, havendo a necessidade de desenvolver políticas para prevenir e dar suporte clínico a estes pacientes. **Objetivos:** Estimar a frequência do uso das substâncias tóxicas como meio de tentativas e suicídio no Hospital de Base de São José do Rio Preto; Correlacionar as tentativas e suicídio por intoxicação exógena a possíveis fatores clínicos e sócio-demográficos; Quantificar o resultado destas tentativas e a interferência do atendimento realizado. **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo e transversal das tentativas de suicídio por intoxicação exógena notificadas nos atendimentos realizados pelo Centro de Assistência Toxicológica de São José do Rio Preto no período entre junho/2010 e dezembro/2013. Os dados obtidos foram registrados na ficha de notificação do Centro de Assistência Toxicológica e no prontuário eletrônico do sistema hospitalar utilizado. Os dados obtidos foram submetidos à análise descritiva. **Resultados:** Foram verificados os dados de 432 prontuários. Verificou-se a predominância entre as mulheres adultas brancas com ensino fundamental incompleto. A principal substância exógena utilizada foi medicamentos (73,5%) em que as tentativas de suicídio ocorreram em residências (94,8%). As principais orientações realizadas nos atendimentos foram em ordem decrescente: Observação clínica, tratamento sintomático, suporte clínico, lavagem gástrica, carvão ativado e antídoto. Os dados analisados apresentaram como desfecho dos atendimentos alta médica em 94,4% dos casos e óbito em 2,3% dos casos. **Conclusão:** A prevenção de tentativas de suicídio deve focar medidas de segurança ao acesso a medicamentos, visto que são as principais substâncias utilizadas dentro de suas residências.

Descritores: Suicídio, Intoxicação Exógena, Toxicologia.