



XII CAIC – Congresso Anual de Iniciação Científica
XV ECIF – Encontro Científico da FAMERP
VII COLIG – Mostra das Ligas Acadêmicas
Dias 06 e 07 de outubro de 2015



**A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA ARACNOIDITE ADESIVA:
UMA DOENÇA SUBDIAGNOSTICADA**

Mariane Carriel Honório¹, Karina Rumi de Moura², Ronaldo Gonçalves Silva³.

¹FACERES, ²FACERES, ³FACERES.

Introdução: A aracnoidite é um processo inflamatório inespecífico causado por invasão do espaço subdural – mecânica, química ou infecciosa - que produz alterações sensoriais e déficit motor. Tal processo resulta em amplificação da reação inflamatória da membrana aracnóidea para outras estruturas intratecais, levando a fibrose e aderências das raízes nervosas, aracnoide, medula espinhal e dura-máter. **Objetivo:** Relatar um caso de aracnoidite adesiva pós acidente em implantação de cateter epidural atentando para o possível diagnóstico precoce, o que resultaria em melhor prognóstico. **Casuística e Métodos:** Trata-se de um caso clínico a qual as informações foram obtidas por entrevista com a paciente, registro fotográfico dos exames diagnósticos e revisão da literatura. **Resultados:** Após procedimento de implantação do cateter para controle algico secundário a fratura sacrococcígea, paciente evoluiu com dor incapacitante persistente, sem a identificação de substrato anatomopatológico que justificasse. A importância do diagnóstico dá-se para identificação da lesão para que o tratamento seja específico para o tipo de dor – neuropática. Estudos indicam que o diagnóstico precoce (até 3 meses) guarda correlação com melhora de prognóstica, porém não tem impacto em cura, posto tratar-se de uma patologia até o momento sem perspectiva de tratamento curativo, apenas evolutivo e sintomático. **Conclusão:** Por trata-se de uma condição rara, incapacitante, na maioria das vezes iatrogênica e de prognóstico indefinido, é importante o conhecimento dos fatores de risco e diagnósticos diferenciais por parte dos profissionais de saúde para a precocidade no diagnóstico e início da terapêutica até o momento preconizada, uma vez que tais medidas têm demonstrado melhora prognóstica, mesmo no sentido de se evitar intervenções invasivas desnecessárias.

Descritores: Dor; Aracnoidite Adesiva; Diagnóstico Precoce; Iatrogenia.